

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Actovegin Forte 200 mg apvalkotās tabletes

Aktīvā viela: *Deproteinized hemoderivative of calf blood*
(*Žāvēts deproteinizēts teļu asi;nu serums*)

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Actovegin Forte rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- 1 Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- 2 Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsaazinās ar savu ārstu.
- 3 Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Actovegin Forte un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Actovegin Forte lietošanas
3. Kā lietot Actovegin Forte
4. Iespējamās blakusparādības
5. Actovegin Forte uzglabāšana
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR ACTOVEGIN FORTE UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Actovegin Forte ir proteīnu nesaturošs teļa asiņu ekstrakts. Tas uzlabo skābekļa uzņemšanu un izmantošanu, veicinot barojošo vielu nokļūšanu šūnās. Tādējādi tiek paātrināta asins plūsma caur smadzenēm. Rezultātā, Actovegin veicina lielāku enerģijas pieplūdi smadzenēm un uzlabo Jūsu atmiņu.

Actovegin Forte 200 mg apvalkotās tabletes tiek lietotas smadzeņu vielmaiņas un cirkulācijas traucējumu ārstēšanai (piemēram, demences, smadzeņu un galvaskausa traumu gadījumā).

Actovegin Forte 200 mg apvalkotās tabletes Kā turpinājums cerebrālo cirkulācijas traucējumu ārstēšanai pēc injekciju un infūziju terapijas.

2. PIRMS ACTOVEGIN FORTE LIETOŠANAS

Nelietojiet Actovegin Forte šādos gadījumos

- ja Jums ir paaugstināta jutība pret deproteinizētu teļu asiņu serumu vai jebkuru citu Actovegin Forte tablešu sastāvā esošo palīgvielu.

Īpaša piesardzība, lietojot Actovegin Forte, nepieciešama šādos gadījumos

- nevajadzētu lietot, ja Jums ir nosliece uz alerģiskām reakcijām vai alerģiska atbildes reakcija lietojot Actovegin Forte vai līdzīgas zāles.

Citu zāļu lietošana

Lietojo Actovegin Forte mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav novērota.

Actovegin Forte lietošana kopā ar pārtiku un dzērieniem

Ietekme nav novērota.

Actovegin Forte 200 mg apvalkotās tabletes jālieto pirms ēšanas (skatīt sadaļu „3. KĀ LIETOT ACTOVEGIN FORTE”)

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pastāstiet savam ārstam, ja esat stāvoklī, barojat bērnu ar krūti vai plānojat grūtniecību. Informācija par Actovegin Forte lietošanu grūtniecības un zīdīšanas periodā ir ierobežota. Lai gan līdz šim nav reģistrēts neviens gadījums par Actovegin Forte negatīvo iedarbību uz grūtniecību vai nedzimušu bērnu/zīdaini, tomēr jāizvērtē potenciālais risks, it īpaši attiecībā uz bērnu. Tāpēc grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā lietojiet Actovegin Forte pēc ārsta norādījumiem.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par dažām Actovegin Forte sastāvdaļām

Viena Actovegin Forte tablete satur 52,3 mg saharozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. KĀ LIETOT ACTOVEGIN FORTE

Vienmēr lietojiet Actovegin Forte tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja vien ārsts nav nozīmējis citādi, parastā deva ir **1 līdz 2 tabletes trīs reizes dienā. Nelietojiet vairāk kā 2 tabletes trīs reizes dienā** (kopā sešas tabletes).

Pirms ēšanas norijiet tableti veselu (nekošļājiet), uzdzerot nedaudz šķidruma.

Lietošanas ilgums

Parasti Actovegin Forte lieto 4-6 nedēļas. Iespējams nesen Jums bijusi ārstēšana ar Actovegin injekcijām vai infūzijām un ārsts Jums ir izrakstījis Actovegin Forte, lai turpinātu ārstēšanu.

Ja esat lietojis Actovegin Forte vairāk nekā noteikts

Līdz šim nav reģistrēts neviens pārdozēšanas gadījums.

Ja esat aizmirsis lietot Actovegin Forte

Nelietojiet dubultdevu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Turpiniet lietošanu tā, kā norādījis ārsts.

Ja pārtraucat lietot Actovegin Forte

Nepārtrauciet lietot Actovegin Forte bez konsultēšanās ar ārstu. Viņš/viņa pastāstīs Jums, cik ilgi ir jālieto šīs zāles, lai sasniegtu sekmīgu ārstēšanās rezultātu.

Pašlaik nav pieejami dati par lietošanu bērniem, tāpēc lietošana šai pacientu grupai nav ieteicama. Konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Actovegin Forte var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnākās Actovegin Forte blakusparādības ir alerģiskas reakcijas (ieskaitot medikamentu izraisītu drudzi un šoka pazīmes). Šīs blakusparādības novērotas reti un tieši tiem pacientiem, kuriem ir nosliece uz alerģiskām reakcijām. Ja novērojat alerģisku reakciju, pārtrauciet lietot Actovegin Forte un konsultējieties ar ārstu.

Retos gadījumos (retāk kā 1 no 1000, bet biežāk kā 1 no 10000 pacientiem) novēro alerģiskas reakcijas (skatīt iepriekš), nātreni (izsitumi uz ādas ar čūlu veidošanos), ādas apsārtums (ar dedzinošu sajūtu), reibonis.

Pie lielākām devām var parādīties sūdzības par nepatīkamām sajūtām kuņģī.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. ACTOVEGIN FORTE UZGLABĀŠANA

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Lai aizsargātu no gaismas, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Nelietot Actovegin Forte pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Actovegin Forte satur

- Aktīvā viela ir žāvēts deproteinizēts teļu asiņu serums (*Deproteinized hemoderivative of calf blood*). Katra tablete satur 200 mg deproteinizētu teļu asiņu serumu (sausā masa).
- 1 Citas sastāvdaļas ir: povidons K90, mikrokristāliska celuloze, magnija stearāts, talki (tabletes kodolā);
dietilftalāts, hipromelozes ftalāts, saharoze, arābijas gumija, hinolīna dzeltenais (E104), povidons K30, makrogols 6000, talki, titāna dioksīds (E171), kalnu glikola vasks (tabletes apvalkā).

Actovegin Forte ārējais izskats un iepakojums

Actovegin Forte apvalkotās tabletes ir iedzeltenas, spīdīgas, apaļas tabletes ar apvalku. Katrā iepakojumā ir 50 tabletes, kas ievietotas brūna stikla pudelītē ar skrūvējamu alumīnija vāciņu.

Ražotājs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Nycomed Austria GmbH
St.Peter Strasse 25
A-4020 Linz
Austrija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA Nycomed Latvia
Duntes iela 6,
Rīga, LV1013
Latvija

Šī lietošanas instrukcija akceptēta: 05.2009.